

La dilatation du col

Systematique ou pas?

Quel médicament?

Type d'IVG

Type d'IVG	Secteur privé	Secteur public	Total
Chir. Avec an.gen.	4 404 - 88,5%	488 – 4,1%	4892 – 29,1%
Chir. Avec an.local	520 – 10,5%	139 – 1,2%	659 – 3,9%
Médicale	52 – 1,0%	11146 – 94,4%	11198 – 66,7%

Dilatation du col

- Avantages
 - Temps d'intervention
 - Évite la lésion cervicale
 - Évite la perforation utérine

 - Toujours?

Keder L. Best practices in surgical abortion *Am. J. Ob. Gyn* 2005

Clinical Guidelines SFP *Contraception* 76(2007)139-156

– Toujours?

- Pour les adolescentes et après 9 semaines
(OMS)

- Avant 18 ans et >10 semaines de gestation

- (RCOG)

• Toujours en attendant aux avantages

Dilatation du col

- Quel médicament?
- Prostaglandines
- Antagonistes de la progésterone -
Mifépristone
- Hégar dilatateurs
- Dilatateurs osmotiques

Prostaglandines

- Misoprostol- Avantage : prix, commodité d'application
- Gemeprost
- Dinoprostone

- Égale efficacité

Mifépristone

- Très efficace
- Plus cher que les prostaglandines
- Dosage: 200mg 36 à 48h avant

Dilatateurs osmotiques

- Dilapan
- Lamichel
 - Efficacité obtenue 3-4h avant l'aspiration
 - Ne peuvent pas être administrés à la maison
 - Exigent entraînement pour application

Misoprostol

- Quel dosage?
- Quel voie d'administration?

Misoprostol

- Dose efficace avec moins d'effets secondaires: 400 μg 3-4h avant
- Quelle voie?
 - Voie vaginal
 - Moins effets secondaires
 - Efficace avec une application 3-4h avant
 - Voie orale
 - 8-12h avant: effets secondaires

Quelle voie?

- Voie vaginal
 - Moins effets secondaires
 - Efficace avec une application 3-4h avant
- Voie orale
 - 8-12h avant: effets secondaires
- Voie sublinguale
 - 2-4h avant : effets secondaires
- Voie buccale- même effet que la vaginale.
- Alternative?